

EXPÉDITION
SCIENTIFIQUE
DE MORÉE.

SECTION DES SCIENCES PHYSIQUES.

TOME III. — 1.^{re} PARTIE.

Zoologie.

Deuxième Section. — *Des animaux articulés.*

PAR M. BRULLÉ,

MEMBRE DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE DE MORÉE;

Les Crustacés par M. GUÉRIN.



PARIS,

Chez F. G. LEVRAULT, imprimeur-libraire, rue de la Harpe, n.º 81.
STRASBOURG, même maison, rue des Juifs, n.º 33.

1832.

INTRODUCTION

OU

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

SUR LES ANIMAUX ARTICULÉS DE LA MORÉE ET DES CYCLADES;

PAR

M. AUGUSTE BRULLÉ.

Lues à l'Académie des sciences dans la séance du 7 Novembre 1831.

DE toutes les parties de l'Europe, la Grèce est sans contredit une de celles dont les productions entomologiques sont le moins connues; et la géographie des insectes retirera d'incontestables avantages des observations faites dans la province la mieux circonscrite de cette contrée célèbre, dont l'histoire naturelle avait été jusqu'ici superficiellement étudiée.

Envisagée dans son ensemble, l'entomologie de la Morée et des Cyclades n'a pas un aspect *sui generis*; elle n'offre pas cette réunion d'espèces qui portent un cachet caractéristique si propre à singulariser une région; le plus grand nombre des espèces rentrent dans les genres européens, et quelques-unes même, déjà connues, se retrouvent en d'autres parties méridionales des terres voisines. Il faut en excepter quelques coupes asiatiques, telles que les *Amphicomes*, etc.

Située à l'extrémité méridionale tout à la fois et orientale de l'Europe, isolée de tous côtés par les mers, excepté en un seul isthme de fort peu d'étendue, on pourrait croire que la Morée doit être peuplée d'insectes également étrangers à l'Europe, à l'Asie et à l'Afrique, ou tout au moins beaucoup plus voisins de ceux de la seconde que de ceux de la

DIPTÈRES.

FAMILLE DES NÉMOCÈRES.

- 623 CULEX KOUNOUDI Br. — Niger, maculis argenteo-villosis; abdominis posteriori parte scutelloque pallidis; thorace rufescente; pedibus nigricantibus; femoribus pene omnino pallide flavis; tarsis argenteo-annulatis. — Long. 5 millim. — (Voyez notre Pl. XLVI, fig. 1.)

DESCR. Tête noire, ornée entre les yeux, en arrière de ceux-ci, à la base des antennes et à l'extrémité des palpes, de lignes et de taches de poils d'un blanc argenté. Corselet d'un roux foncé, marqué sur les côtés de quelques petites taches d'un blanc d'argent: de pareilles taches décorent aussi le prothorax, le dessus du mésothorax et l'écusson; ce dernier et les côtés du métathorax sont d'un roux pâle. Ailes très-joliment irisées, sans taches particulières, garnies de poils bruns le long des nervures: leur bord inférieur ou interne muni d'une frange de poils de même couleur. Balanciers d'un roux pâle. Pattes d'un brun foncé; cuisses d'un jaune pâle en dessus jusque près de leur extrémité: cette dernière partie revêtue de petits poils argentés; tarses entourés à la base de leurs articles d'un large anneau de semblables poils. Abdomen noir en dessous et à la base; le bord inférieur des segmens et la moitié postérieure de l'abdomen d'un roux pâle: chaque segment est marqué de chaque côté d'une tache de poils argentés, et les deux premiers en portent même à leur partie dorsale.

Hab. Cette espèce est aussi incommode que jolie; depuis le milieu de Mai jusqu'à la fin de la saison chaude elle est répandue dans l'air par troupes considérables, surtout dans le voisinage des eaux.

Obs. Nous avons conservé à cet insecte le nom qu'il porte dans le pays; les Grecs l'appellent en effet Κουνούπι (cousin).

- 624 TIPULA HELLENORUM Br. — Cinerea; capite et prothorace linea rufo-fuscescente; mesothorace lineis 4 notatis; abdomine apice ferrugineo, flavo trifasciato, fascia mediæ vitta fusca longitudinali divisa; alis pallide fuscescentibus, lunula alba. — Long. 26 millim. — (Voyez notre Pl. XLVI, fig. 3.)

DESCR. Tête d'un gris cendré, revêtue de quelques poils noirs et marquée entre les yeux d'une bande longitudinale d'un roux brun qui ne s'étend pas jusqu'au bord postérieur; antennes brunes, avec un reflet grisâtre, leur deuxième article d'un jaune roux; bec d'un brun roux sur les côtés et en avant; palpes bruns, légèrement roux à la base. Corselet d'un gris cendré, légèrement roussâtre en avant; prothorax orné d'une bande longitudinale d'un roux brun; mésothorax