

庫 蚊 一 新 种

孟 慶 華

(貴陽醫學院生物學教研組)

黃氏庫蚊¹⁾ *Culex (Culex) huangae*, sp. nov.

雄蚊 头頂的絕大部有很多稀疏、長窄而彎，在顯微鏡下為黃白色的鱗和稀疏、直立叉狀、棕黑色的鱗；有少數直立叉狀淡色的鱗。頭部兩側復眼之後各有一羣灰白色寬而平鋪的鱗。喙暗棕；伪关节稍微色淡但未形成清楚的淡色環；喙的尖端超過觸鬚第4節的中央。觸鬚棕黑；第3節的末段外側和末兩節的內外兩側有棕色的長毛叢；第2—3節交接處色淡；第3節外側腹面有一灰白縱走條未延伸到基部和差一點未到末端；第4節腹面有一灰白條從基部向前延伸差一點未到末端；第5節基部的腹面有一灰白斑。

前胸背板、中胸盾板和小盾板的皮膚暗棕；在顯微鏡下其鱗金黃，但前胸背板、翅基的上方、小盾板與其前的鱗較色淡。胸側板棕色；前胸側板有一羣，腹側板和中胸後側板各有二羣灰白色的寬鱗；中胸後側板下毛一根，很發達。中胸後背板棕色。

翅長3.7毫米；翅鱗暗棕；前後橫脈間距約為後橫脈的1.5倍長；前叉室顯然比後叉室靠近翅基。平衡棒棕色。

腿暗棕；各腿基節和轉節色較淡並各在外側有一羣淡色寬鱗；各腿股節腹面、前脛腹面和中與後脛後面、膝關節和踝關節色淡；跗節無淡色環但各腿第一跗節的後面有一稍微淡色的縱走條。

腹部背面暗棕；第2—8背板的基部有淡色橫帶，帶長（從前到後）約背板的 $\frac{2}{3}$ — $\frac{1}{2}$ 或更長一些，帶的側緣不達到背板的側緣，第二節的帶離側緣更遠。第3—7腹板各有三個黑鱗斑位於中央和兩側從後緣向前伸但不達到前緣²⁾。

抱握器基節表面有小刺³⁾；其背面有稀疏而較短的剛毛；側面有長大的剛毛；腹面有明顯的特徵：(1)基部和亞頂葉的附近無剛毛而僅有小刺（未在圖上繪出）；頂端有一小叢長而柔軟且可彎曲的毛；約在中段有一大叢細長的毛，從外部的毛較硬而呈一般剛毛的形狀，其內部的毛柔軟而可彎曲；大毛叢的後面有短小的剛毛。(2)亞頂葉在干燥標本中黑色，光滑而無小刺，其頂端指向外方偏前；其上有兩個在自然情況下指向前方偏外或外方偏前約等長的葉片，外片比內片寬；其基部的前面有兩根粗大的刺狀毛和一對彎曲的毛。(3)亞頂葉的前方有一根粗大的刺狀毛；毛基的前方與其背面的小刺很稠密。抱握器指節的尖端超過最前的一根刺狀毛，其末段有兩根小毛；爪呈三角形。第10腹板側臂長

1) 黃慶華同志在黨和政府的培養下，從事蚊蟲工作，認真負責，追求真理，並參加防疫工作，為人民解除痛苦，特命此名，以表示我對她及其他青年同志們在滅蚊蟲戰線上的熱情努力的歡欣快慰的心情。

2) 干燥標本不易看到腹板的暗斑，特別是其側斑，但經過水浸腹部膨脹後，則極易在解剖鏡下觀察。

3) 毛生在毛杯中可以活動；小刺雖然形似毛，但其基部無毛杯，所以是不活動的。

而向腹面和内侧弯。阳茎端的侧板有明显的特征：腹叶粗大、最长；背叶最短小；侧叶的前突起尖而后突起圆¹⁾。

雌蚊 头顶的窄鳞和直立叉状的鳞较密。触鬚暗棕，可有一些淡色鳞。喙中段的腹面较色淡。翅前后横脉间距稍微比后横脉长一些。腹节背板基部的淡鳞带后缘凸，其两侧向后延形成侧斑；在水浸标本可見基部淡鳞带与侧部淡鳞斑连接处宽阔²⁾。其他同雄蚊。

成熟幼虫³⁾ 唇基前毛色淡，基部粗，其余逐渐变细，末端非常细而末端非常尖，基部可有短小的侧枝。A 毛分 9—10，B 毛分 4，C 毛分 4—5 枝；D 毛短小并仅有微小的侧枝；E 毛分 2—5，F 毛分 3—7 枝。触角有小刺；触角毛生于中央之前；毛前的一段较色淡，小刺很少而小；亚顶毛近尖端；一根顶毛约与亚顶毛等长并超过其另一根的 2 倍长；桶状器的末端为锥状的透明部。

櫛齿 32—41 个，齿的末端圆而有缘
縷。呼吸管指数 3—4；梳齿 8—12 个；一

般有五对呼吸管毛，其第四对侧位，其余腹位；有些标本的第一对或第二对管毛可缺少一根，这样就有四对半毛。内中侧尾毛分 2 枝。尾鞍侧毛不分或分 2 枝，比较的腹面稍微长一些。尾鳍由六对毛组成，每根毛在基部分 5—10 枝，最长的毛不超过或超过内中侧尾毛的短枝。尾鳃末端尖；二对都比尾鞍稍长或长很多但不到其 2 倍长；背对比腹对稍长。

模式标本 完模标本 (holotype)：1 ♂ 蚊与其尾器的染色装片标本，由黄婉霞同志于 1955 年 5 月中旬由幼虫培养出来的；幼虫采集于昆明西面潘家湾路旁浇菜用的水沟中，其水不流动、绿色、内有水草和浮萍。付模标本 (paratypes)：黄婉霞与孙克祥同志于上述时间与地点采集的 3 ♂、4 ♀ 与 10 个成熟幼虫；其中的 2 ♂ 与 2 ♀ 已制成腹部与尾器装片。贵阳医学院传染病昆虫学训练班第一班学生于 1952 年在云南芒市从清水池中所得的幼虫中培养出 1 ♂ 蚊。萧爱光同志于 1957 年 10 月在贵阳从慈菇田中得的幼虫中培养出 1 ♂ 蚊。这些标本也作了本文描述的参考。除贵阳标本将存放江西医学院寄生虫学

- 1) 本文所用阳茎端侧板各部的名称是按照尾部原来的位置(在旋转前)而命名的。本文的背叶相当于一般分类学家的腹角 (ventral cornu)；腹叶相当于中突起 (median process)；侧叶的前后突起相当于外叶和侧叶 (external & lateral processes)。
- 2) 致倦库蚊 (*C. fatigans*) 经过同样处理后，可見其基带与侧喉的连接处也同样是宽的。
- 3) 黄婉霞同志告訴我已經有多次从这种幼虫培养出本文所报告的新种库蚊成虫；因此，虽未隔离幼虫皮，也可断定此处所报告的成虫与幼虫同属一种。




图 1 雄蚊抱握器腹面观 (Holotype)

教研組外，其他标本存放貴陽医学院生物学教研組。

亲緣关系 本新种与致倦庫蚊 (*C. fatigans*) 的亲緣关系最近；二种的幼虫与成虫非常相似，惟幼虫呼吸管毛的数目与雄蚊尾器有明显的区别。二种的主要区别于下表：




图2 雄蚊第10腹板与阳茎

A. 第10腹板与阳茎背面观 (Holotype);
B. 阳茎侧板 (Paratype, 昆明)。

致倦庫蚊	新 种
1. 雄蚊抱握器基节的腹面有稀疏的刚毛，无稠密的细长的毛丛；亚顶叶的前部有三根粗大的刺状毛列为紧密的一排，其后部有一对弯曲的毛、一对不等大的叶片（前叶片短小而窄）和一根单独的毛。	1. 抱握器基节的腹面有前述的两丛稠密的细长的毛；三根粗大的刺状毛中的二根接近而生于亚顶叶基部的前面，其另一根分离而生于亚顶叶的前方；亚顶叶上有一对弯曲的毛和一对约等大的叶片但无一根单独的毛。
2. 雄蚊第10腹板侧臂短而直。	2. 该部侧臂长而弯。
3. 阳茎端侧板的背叶很宽大，腹叶细而末端尖，侧叶的前后突起都不显著。	3. 背叶短小，腹叶粗大而末端圆，侧叶的前后突起显著。
4. 成熟幼虫呼吸管毛四对。	4. 呼吸管毛一般五对，有时四对半。

标本的鑑定 幼虫与雄蚊的鑑定并无困难。雄蚊的简单鑑定法为用显微鏡的低倍物鏡或解剖鏡觀察从其抱握器側后角向外或向后伸出的一对叶片的末半段；在致倦庫蚊的同一位置仅有一个叶片的末半段伸出。新种与致倦庫蚊的雌蚊尚未查出明显的区别；新种的体积可能較小，翅上前后横脈間距似較短，受精囊的形状可能有区别，其顏色似較淡，腹节腹板的暗斑似較发达；但通过少数标本的觀察，似已能看出这些方面变异頗大；这些性状能否用于鑑別，并是否另有区别存在，尚需要作进一步的研究。

参考资料 黄婉霞同志于1957年6月6日給我的来信，有参考的价值，节录于此，以供参考：“成虫吸人血；我們在潘家湾人室和誘蚊器里采集的約90%为此蚊，并且雌蚊有吸血的。潘家湾水沟、水坑較多；其中除这种蚊幼虫外，仅有二带喙庫蚊幼虫，致倦庫蚊幼虫仅偶爾見到。在昆明南面豆腐营（靠近云南紡紗厂后門）的人室里也收集到很多已吸血的雌蚊。孳生处（与希氏庫蚊同生一处）有污水池、水沟、水坑、西山庙內积水缸、紡織厂旁染布用后的污水大坑、清水坑。成虫棲息于人室、馬廄、野外竹林。”

A NEW SPECIES OF *CULEX*

MENG, C. H.

Biology Department, Kweiyang Medical College

Culex (Culex) huangae, sp. nov.

This species is closely related to *C. fatigans* Wied., 1828. It differs from the latter chiefly in the following respects: Side piece of the male terminalia with two groups of long hairs on the ventral surface beside the shorter ones; one small group arises from the apex while the other, a large group, is attached to the middle portion. The hairs of the outer portion of the middle group are stiff and of normal shape while the hairs of the inner portion of the same group are very soft and may curl when mounted in balsam. The subapical lobe of the side piece bears a pair of leaves of almost equal sizes, a pair of curved hairs and a pair of stout spines in front of its base; a 3rd similar stout spine is located some distance in front of the subapical lobe. Tenth sternites of the male with long and curved lateral arms. Lateral plate of the phallosome with dorsal lobe (ventral cornu of authors) short and small, ventral lobe (median process of authors) stout and rounded, and lateral lobe with prominent anterior and posterior processes (external and lateral processes of authors). Siphon of the mature larva with 5 pairs of hair tufts, the 4th pair of which are lateral in position while the other pairs are ventral in position; in some specimens, one tuft of the 1st or 2nd pair may be missing, thus making 4 and a half pairs of hair tufts.

Holotype: 1 male, with stained and mounted terminalia, reared from larva collected from a ditch with greenish stagnant water, aquatic plants, and lemnas in the suburb of Kunming by Miss W. H. Huang in middle of May, 1955. Paratypes: 3 males, 4 females, and 10 mounted mature larvae, collected from the same place. One male reared from larva collected from ground pool by students of the author in Mongshieh, Yunnan Province, 1952, and a male reared from larva collected from a field of *Sagittaria* sp. by Miss E. K. Hsiao in Kweiyang, in October, 1957. The type specimens are now deposited in the Biology Department of the Kweiyang Medical College.